

# پینالژری®

## استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن

کپسول

استامینوفن ۳۲۵ میلی گرم

کافئین ۴۰ میلی گرم

ایبوپروفن ۲۰۰ میلی گرم



استامینوفن، کافئین، ایبوپروفن به صورت کپسول، حاوی ۳۲۵ میلی گرم استامینوفن، ۴۰ میلی گرم کافئین و ۲۰۰ میلی گرم ایبوپروفن تولید و درده بلیستره عددی در جعبه‌ی چاپی ارائه می‌گردد.

### راهنمای عمومی بیماران

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف خودسرانه آن در شرایط مشابه و یا توصیه به دیگران، جداً خودداری نمایید.

### موارد مصرف

تسکین سردرد، درد عضلانی، دردهای خفیف ناشی از سرماخوردگی، دردهای ناشی از آرتروز، درد دندان، درد پشت، درد قاعدگی و کاهش تب.

### هشدارها و اقدامات احتیاطی

قبل از مصرف این دارو در صورت داشتن هر یک از شرایط زیر یا پزشک و یا داروساز خود مشورت نمایید:

- کودک یا نوجوان مبتلا به آنفولانزا یا آبله مرغان.
- مشکلات خونریزی مانند هموفیلی، بیماری قون ویلبراند و پایین بودن پلاکت خون.
- در صورت سابقه بروز راش پوستی، آسم و تنگی نفس و علائم آلرژیک (مانند خارش و آبریزش بینی و تورم صورت) متعاقب مصرف ایبوپروفن، آسپرین و یا سایر داروهای مشابه.
- مصرف هم زمان NSAID یا داروی دیگری که حاوی استامینوفن می‌باشد.
- دوران بارداری (به خصوص سه ماه سوم) و شیردهی.
- کودکان زیر ۱۲ سال.

- ابتلا به بیماری شدید کبدی، کلیوی، زخم و خونریزی فعال گوارشی، مشکلات تنفسی و سردردهای مداوم.

- ابتلا به بیماری قلبی، فشار خون، اشکال در انعقاد خون. در صورتی که به صورت سه‌هفته‌ای مقدار بیشتر از مقدار تجویز شده دریافت نمودید به همراه بلیستر دارو در نزدیک‌ترین زمان به نزدیک‌ترین مرکز درمانی مراجعه نمایید.

اگر یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، در صورتیکه زمان نوبت بعدی نرسیده است، دارو را مصرف نمایید اما در صورتی که به زمان نوبت بعد رسیده‌اید، دوز را دو برابر نکنید و مطابق روال فقط دوز نوبت بعد را مصرف نمایید. در صورتی که احساس خواب‌آلودگی و یا سرگیجه می‌کنید از رانندگی و انجام کارهایی که به هوشیاری و دقت نیاز دارند، خودداری نمایید.

### تداخلات دارویی

در صورت مصرف هر یک از داروهای زیر یا پزشک و یا داروساز خود مشورت نمایید: لیتیم، رقیق‌کننده خون (مانند: وارفارین)، داروهای قلب یا فشار خون از جمله دیورتیک‌ها، کورتیکواستروئیدها (مانند: پردنیزولون)، کینولون‌ها (مانند: سیپروفلوکساسین)، تتوئیلین، دولوکستین، افدرین، متوکلوپرامید، دومپیدون، کلسیتامین، سایر داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (مانند: ناپروکسن، سایر فرآورده‌های حاوی ایبوپروفن، دیکلوفناک)، نوشیدنی‌ها و داروهای حاوی کافئین، باربیتورات‌ها، داروهای مهارکننده مونوآمین اکسیداز (مانند: سلازین)، فنی تونین، سامیتدین.

### منع مصرف

در موارد زیر از مصرف این دارو اجتناب کنید:

- سابقه حساسیت به استامینوفن، کافئین، ایبوپروفن و یا هر یک از ترکیبات جانبی محصول.
- سابقه واکنش آلرژیک (به صورت آسم، کهیر، تنگی نفس، آنفیلاکسی و یا آنژیوادم...) به سایر داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAID) و آسپرین.
- مصرف همزمان با سایر داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAID) و ترکیبات حاوی استامینوفن.
- ابتلا به ناراحتی قلبی، کلیوی و یا کبدی.
- مصرف در کودکان کمتر از ۱۲ سال.

### بارداری و شیردهی

اگر در دوران بارداری و یا شیردهی قرار دارید، پیش از مصرف این دارو حتماً با پزشک خود مشورت نمایید.

### مقدار و نحوه مصرف

دارو را همراه و یا پس از غذا، همراه یک لیوان پر آب مصرف نمایید.

دارو را پیش از خواب مصرف نمایید.

از جویدن، خرد کردن و یا باز کردن کپسول اجتناب نمایید.

### مقدار توصیه شده

#### بزرگسال

یک کپسول هر ۴-۶ ساعت مصرف گردد. بیش از ۶ کپسول در روز با نظر پزشک مصرف گردد.

بیش از شش کپسول (۱۹۵۰ میلی گرم استامینوفن، ۱۲۰۰ میلی گرم ایبوپروفن) در هر دوره ۲۴ ساعته مصرف ننمایید.

#### سالمدان

سالمدان با مشکلات زمینهای، در معرض عوارض جدی عوارض جانبی هستند. در صورت لزوم مصرف NSAID، باید از کمترین دوز مؤثر برای کوتاه‌ترین مدت ممکن استفاده شود و بیمار در طول دوره درمان به طور منظم از نظر خونریزی گوارشی بررسی گردد.

#### کودکان

مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد. در کودکان ۱۲ سال مصرف نگردد.

### عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته گردد. گرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود اما در صورت بروز هر یک از علائم زیر فوراً به پزشک مراجعه نمایید:

مدفوع تیره، وجود خون روشن در مدفوع، خواب‌آلودگی، سبکی سر، سرگیجه، تنگی نفس، حالت تهوع، استفراغ، استفراغ خونی، درد شکم، تپش قلبی، بی‌خوابی، تحریک پذیری، لرزش، ادم، کهیر، راش پوستی، تورم صورت، لب و گلو، سردرد، تحریک جانشون، خونریزی گوارشی، سمیت کبدی، خارش، درد قفسه سینه، سردرد، واکنش‌های حساسیتی، کاهش یا افزایش ناگهانی حجم ادرار، درد پشت، زردی پوست، چشم و مدفوع.

### نحوه نگهداری

دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد به دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

### سامانه پیامکی جهت ثبت و دریافت شکایات:

۰۲۲ ۱۸۰۱۸۰۳۳۰۰۰



ساخت شرکت داروسازی روجین  
منطقه ویژه اقتصادی کاوه-ایران

# PINALGY®

## Acetaminophen / Caffeine / Ibuprofen

Capsule	
Acetaminophen	325 mg
Caffeine	40 mg
Ibuprofen	200 mg



Acetaminophen, Caffeine, Ibuprofen is produced as Capsule contains 325 mg Acetaminophen, 40 mg Caffeine, 200 mg Ibuprofen and is presented in 10 blisters (Each blister contains 10 capsules) inside a printed box.

### General Patient Guide

• This Medicine is prescribed for your current illness, so do not use it in similar situation without a physician's prescription and do not advise others.

### + Acetaminophen, Caffeine, Ibuprofen is used for

• Headache, muscle pains, cold and flu pains, arthritis aches, toothaches, premenstrual and menstrual cramps pains, fever, backache.

### + Warnings and precautions

Talk to your physician or pharmacist before taking this product if:

- You are a child or teenager with influenza (flu) or chickenpox;
- You have bleeding problems, such as hemophilia, von Willebrand disease, or low blood platelets;
- You have had a severe allergic reaction (e.g., severe rash, hives, swelling of the face, breathing difficulties, dizziness) to Aspirin, Tartrazine, or a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) (eg, Celecoxib, Ibuprofen, Naproxen);
- You are taking an NSAID or another medicine that contains Acetaminophen.
- Pregnancy (especially the third trimester) and breastfeeding.
- Children under 12 years.
- Severe liver or kidney diseases, active gastrointestinal ulcers or bleeding, respiratory problems and persistent headaches.
- Cardiovascular diseases, high blood pressure, problems with blood coagulation system.

If you accidentally take too many capsules, contact your doctor or nearest hospital emergency department immediately for advice. Remember to take this leaflet or any remaining capsules with you.

If you forget to take your PINALGY® Take it as soon as you remember, unless it is nearly time for your next dose. If you miss a dose, do not take a double dose and just use next dose. If you feel drowsiness or dizziness, you should not drive or operate machinery or do activities which require your attention or quick reactions.

### + Drug interactions

Lithium, Warfarin, hypertension medication including diuretics, Corticosteroids (such as Prednisolone), Quinolones (i.e., Ciprofloxacin) Theophylline, Duloxetine, Ephedrine, Metoclopramide, Domperidone, Cholestyramine, Other nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) such as: Naproxen, other products containing Ibuprofen, Diclofenac, Caffeinated beverages and drugs, Barbiturates, mono amine oxidase inhibitors such as Selegiline, Phenytoin and Cimetidine.

### + Contraindication

- Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients.
- History of allergic reaction (in the form of asthma, urticaria, shortness of breath, anaphylaxis or angioedema) to other nonsteroidal anti-inflammatory drugs and Aspirin.
- Concomitant use with other nonsteroidal anti-inflammatory drugs and Acetaminophen-containing compounds.
- Heart, kidney or liver failure.
- Consumption in children under 12 years.

### + Pregnancy and Lactation

• If you are pregnant or breast-feeding or think you may be pregnant, ask your physician for advice before taking this medicine.

### + How to take

- Take the medicine with or after a meal with a full glass of water.
- Do not take the medicine before going to bed.
- Avoid chewing, crushing or opening the capsule.

### + Recommended Dose

#### - Adult

- Take one capsule every 4-6 hours. Take more than 6 capsules a day with your physician's advice.

#### - Elderly

• Elderly people with underlying problems are exposed to serious side effects. If NSAIDs are required, the lowest effective dose should be used for the shortest possible time and the patient should be monitored regularly for gastrointestinal bleeding during treatment.

#### - Use in children

- Consumption and amount should be determined by your doctor. Do not use in children under 12 years.

### + Possible side effects

- Each drug, along with the desired therapeutic effects, may cause some side effects. Although not all of these side effects can be seen in one person, consult your doctor if any of them occur:
- Dark stools, blood in the stools, drowsiness, lightheadedness, dizziness, shortness of breath, nausea, vomiting, bloody vomiting, abdominal pain, palpitations, insomnia, irritability, tremors, edema, urticaria, skin rash, swelling of the face, lips and throat, Stevens-Johnson syndrome, gastrointestinal bleeding, hepatotoxicity, pruritus, chest pain, headache, allergic reactions, sudden decrease or increase in urine volume, back pain, yellowing of the skin or eyes, pale stools.

### + Storage

- Keep this medicine out of the sight and reach of children.
- Do not use this medicine after the expiry date.
- Store below 30° C, Protect from light and moisture.



Manufactured by Rouquine Pharmaceutical Co  
Kaveh Special Economic Zone - Iran