

Instructions for Use

multi- sanostol[®] syrup

Composition in each 5 ml of syrup

Vitamin A	1200 I.U.
Vitamin C	100 mg
Vitamin E	14 I.U.
Vitamin D3	800 I.U.
Vitamin B1	0.8 mg
Vitamin B2	0.8 mg
Niacin	5 mg
Vitamin B5	2 mg
Vitamin B6	0.4 mg
Folic Acid	150 mcg
Vitamin B12	5 mcg

Other ingredients

Sodium Hydroxide, Sucralose, Liquid Glucose, Sucrose, Sodium Benzoate, Sorbic Acid, Xanthan Gum, Malt Extract, Polysorbate 80, Grapefruit Juice Concentrate, Orange Juice Concentrate, Orange Oil and Purified Water.

Pharmaceutical form and contents

Syrup

Pack with 155 ml

Pharmacotherapeutic / Indication group / Action mechanism
Multivitamin

Indications

Improves the general well-being of the body and provides the body with essential vitamins and for the prevention of vitamin deficiencies, for boosting the immune system, as a preventive measure in status of physical and mental exhaustion, for the prevention of loss of appetite, for the improvement of general well-being when recovering from illness (shorter convalescent period).

Contraindications

Multi-sanostol must not be used by persons with known hypersensitivity to one of the active ingredients or any of the other constituents.

As with all preparations containing vitamin D, multi-sanostol must not be taken in hypercalcemia (excess of calcium in the blood) or in hypercalciuria (excess of calcium in the urine).

Multi-sanostol should not be used without medical advice in the presence of renal calculus or Boeck's disease (sarcoidosis).

Special warnings and precautions for use

Consult your doctor before taking multi-sanostol during pregnancy and lactation.

If you are taking any other medicine or supplement product, please consult your doctor or pharmacist before use.

This product contains 0.97 mg of polysorbate 80 per 5 ml of syrup.

This product contains 7.398 mg of sodium benzoate per 5 ml of syrup.

This product is a supplement and it is not intended for diagnosis, prevention and treatment.

Posology and method of administration

The following information applies unless multi-sanostol has been otherwise prescribed by your doctor. Please follow these instructions, otherwise multi-sanostol may not have the desired effect!

Children aged 1 to 5 years take 5 ml daily.

Children aged above 5 years and adults take 10 to 15 ml daily.

(Scaled spoon included)

Incorrect use and overdose

Doses in excess of those indicated, especially with concurrent use of other vitamin A and vitamin D preparations, may lead to vitamin A or vitamin D overdose, respectively.

Undesirable effects

There are no known side effects when taken as prescribed. If you experience any side effects not mentioned in this leaflet, please inform your doctor or pharmacist.

Storage conditions

Store below 25°C.

Protect from light.

More information

With orange flavor

Note

Shake well before use.

Keep out of the reach of children.

License Holder: Rougine Pharmaceutical Co.

Kaveh Special Economic Zone - Iran

شریت مولتی سانستول®

ترکیبات در هر ۵ میلی لیتر شربت	
ویتامین آ	۱۲۰۰ واحد بین المللی
ویتامین ث	۱۰۰ میلی گرم
ویتامین ای	۱۴ واحد بین المللی
ویتامین ۳د	۸۰۰ واحد بین المللی
ویتامین ب ۱	۰/۸ میلی گرم
ویتامین ب ۲	۰/۸ میلی گرم
نیاسین	۵ میلی گرم
ویتامین ب ۵	۲ میلی گرم
ویتامین ب ۶	۰/۴ میلی گرم
فولیک اسید	۱۵۰ میکروگرم
ویتامین ب ۱۲	۵ میکروگرم

این محصول حاوی ۰/۹۷ میلی گرم ماده پلی سوربات ۸۰ در هر ۵ میلی لیتر شربت می باشد.
این محصول حاوی ۷/۳۹۸ میلی گرم ماده سدیم بنزوات در هر ۵ میلی لیتر شربت می باشد.
این فرآورده یک مکمل است و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان نمی باشد.

مقدار و نحوه مصرف

اطلاعات زیر در صورتیکه پزشک روش مصرف دیگری تجویز کرده باشد قابل استفاده می باشد. لطفاً راهنمایی های زیر را دنبال فرمایید، در غیر این صورت ممکن است شربت مولتی-سانستول تأثیر دلخواه را نداشته باشد.
کودکان ۱ تا ۵ سال روزانه ۵ میلی لیتر.
کودکان بالای ۵ سال و بزرگسالان روزانه ۱۰ تا ۱۵ میلی لیتر.
(قاشق درجه بندی در جعبه وجود دارد)

مصرف نادرست

مصرف بیش از میزان اشاره شده به ویژه همزمان با محصولات حاوی ویتامین آ و ویتامین د ممکن است منجر به افزایش شدید دوز به ترتیب در ویتامین آ و ویتامین د در بدن شود.

اثرات ناخواسته

هیچگونه عوارض جانبی شناخته شده ای در صورت مصرف دوز تجویز شده وجود ندارد. در صورت بروز عوارض جانبی ذکر نشده در این برگه، لطفاً مراتب را به پزشک خود و یا داروساز اطلاع دهید تا در مورد اقدامات ضروری بعدی تصمیم گیری نماید.

شرایط نگهداری

در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود.

اطلاعات بیشتر

با طعم پرتقال

نکته

قبل از مصرف شیشه را خوب تکان دهید.
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

سایر ترکیبات

سدیم هیدروکسید، سوکرالوز، گلوکز مایع، ساکارز، سدیم بنزوات، اسید سوربیک، زانتان گام، عصاره مالت، پلی سوربات ۸۰، کنسانتره آب گریپ فروت، کنسانتره آب پرتقال، روغن پرتقال و آب تصفیه شده.

شکل و مقدار فراورده
شربت ۱۵۵ میلی لیتری

گروه مکمل

شربت مولتی ویتامین

موارد مصرف

کمک به سلامت عمومی بدن و تأمین ویتامین های ضروری مورد نیاز بدن.

موارد منع مصرف

شربت مولتی-سانستول نباید در افراد مبتلا به حساسیت شدید به یکی از ترکیبات مؤثره و یا سایر مواد تشکیل دهنده استفاده شود.

مانند تمام محصولات حاوی ویتامین د، شربت مولتی-سانستول نیز نباید توسط مبتلایان به بیماری هایپرکلسمی (کلسیم بالا در خون) و هایپرکلسمی اوریا (کلسیم بالا در ادرار) مصرف شود.
شربت مولتی-سانستول نباید بدون مشورت پزشک در زمان ابتلا به سنگ کلیه و نیز بیماری بویک (سارکوئیدوز) مصرف شود.

هشدارها و احتیاط های خاص

پیش از مصرف شربت مولتی-سانستول در دوران بارداری و شیردهی با پزشک خود مشورت نمایید.
در صورت مصرف همزمان با فرآورده ها یا داروهای دیگر پیش از مصرف با پزشک خود و یا داروساز مشورت نمایید.

سازنده و صاحب پروانه ساخت: شرکت داروسازی روزین
منطقه ویژه اقتصادی کاهک-ایران

سامانه پیامکی جهت ثبت و دریافت شکایات: ۳۰۰۰۵۳۸۱۸۰۱۰۲۲