سانستول® سانوبن

(با طعم پرتقال)

ترکیبات در هر ۵ میلی‌لیتر شربت	
کلسیم (کلسیم کربنات)	۳۰۰ میلی‌گرم
زینک (زینک گلوکونات)	۴ میلی‌گرم
ویتامین د۳	۴۰۰ واحد بین المللی
منیزیم (منیزیم اکساید)	۶۵ میلی‌گرم
ویتامین کا۲	۲۰ میکروگرم

شکل و مقدار فرآورده
شربت ۱۵۵ میلی‌لیتری

گروه مکمل
ویتامین‌ها به همراه مواد معدنی

موارد مصرف
کمک به رشد و استحکام استخوان‌ها
کمک به حفظ سلامت استخوان‌ها و دندان‌ها
حفظ ساختار و استحکام اسکلتی در طول دوران رشد

کلسیم: فراوان‌ترین ماده معدنی در بدن، که ماده اصلی سازنده استخوان و دندان‌ها بوده و برای حفظ ساختار و استحکام اسکلتی در طول دوران رشد حیاتی است.
ویتامین د: با تسهیل جذب کلسیم و فسفر از دستگاه گوارش، در کمک به رشد استخوان‌ها و حفظ سلامت آن‌ها مشارکت می‌کند.
منیزیم: در حفظ ساختار طبیعی استخوان‌ها نقش داشته و در متابولیسم طبیعی کلسیم و ویتامین د مشارکت می‌کند.
زینک (روی): در تشکیل و بازسازی بافت استخوانی نقش داشته و به حفظ سلامت استخوان ها کمک می‌کند.
ویتامین کا۲: به هدایت کلسیم به سمت بافت استخوانی کمک کرده و در حفظ سلامت طبیعی استخوان‌ها نقش دارد.

موارد منع مصرف
سانستول® سانوبن در افرادی که به هر کدام از ترکیبات این شربت حساسیت دارند، نباید مصرف شود.

هشدارها و احتیاطات
در صورت مصرف همزمان با فرآورده‌ها یا داروهای دیگر مانند داروهای ضدانعقاد از قبیل وارفارین، آنتی‌بیوتیک‌ها مانند تتراسایکلین و فلوروکینولون، لووتیروکسین، بیس‌فسفونات ها مانند آلندرونیت و مکمل‌های حاوی آهن قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک استفاده شود.
در صورت ابتلا به بیماری‌های کلیوی، سنگ کلیه، هایپرکلسمی یا هایپرپاراتیروئیدیسم، بیماری بوئک (سارکوئیدوز) قبل از مصرف با پزشک مشورت شود.
از مصرف بیش از مقدار توصیه‌شده خودداری شود.
این فرآورده مکمل است و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان نمی‌باشد.

تداخل در مصرف
مصرف همزمان ویتامین د در کنار شربت سانستول® سانوبن می‌تواند باعث افزایش شدید دوز **ویتامین د** در بدن شود.

مقدار و نحوه مصرف
مصرف در کودکان زیر یک سال زیر نظر پزشک توصیه می‌شود.
کودکان ۱ تا ۸ سال ۵ میلی‌لیتر یک بار در روز.
کودکان بالای ۸ سال و بزرگسالان ۵ میلی‌لیتر دو بار در روز.
(قاشق درجه‌بندی در جعبه وجود دارد)
زمان مناسب جهت مصرف این فراورده بعد از وعده غذایی میباشد.
قبل از مصرف شیشه را خوب تکان دهید.

عوارض جانبی:
در صورت مصرف فرآورده مطابق با مقدار توصیه‌شده، این فرآورده معمولاً به خوبی تحمل می‌شود. با این حال، ممکن است ناراحتی‌های خفیف گوارشی یا به ندرت واکنش‌های حساسیتی بروز کند. در صورت بروز هرگونه عارضه جانبی، با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

سایر ترکیبات:
دی‌سدیم هیدروژن فسفات، اسید فسفریک، سوکرالوز، ساکاروز، گلیسرین، سوربیتول ۷۰ درصد، پروپیل پارابن، متیل پارابن، پلی‌سوربات ۸۰، آویسل RC-۵۹۱، اسید سیتریک انهیدروس ، عصاره مالت، کنسانتره پرتقال، رنگ خوراکی زرد، طعم‌دهنده پرتقال، زانتان گام، آب تصفیه‌شده.

شرایط نگهداری
در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از نور نگهداری شود.
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

Sanostol® Sanobone

With Orange flavor

Composition in each 5ml of syrup	
Calcium (as Calcium carbonate)	300 mg
Zinc (as Zinc gluconate)	4 mg
Vitamin D3	400 IU
Magnesium (as Magnesium Oxide)	65 mg
Vitamin K2	20 mcg

Pharmaceutical form and contents
Syrup
Bottle with 155 ml

Pharmacotherapeutic / Indication group / Action mechanism
Vitamins with minerals

Indications
Supports healthy bone growth
Helps maintain strong bones and teeth
Maintaining skeletal structure and strength throughout growth

Calcium: The most abundant mineral in the body and the primary structural component of bones and teeth. It is essential for maintaining skeletal strength and integrity throughout growth.
Vitamin D: Facilitates the absorption of calcium and phosphorus from the gastrointestinal tract, contributing to bone growth and the maintenance of a healthy skeletal system.
Magnesium: Contributes to the maintenance of normal bone structure and plays a role in the normal metabolism of calcium and vitamin D.
Zinc: Contributes to bone formation and remodeling and helps maintain healthy bones.
Vitamin K2: Helps direct calcium to bone tissue and contributes to the maintenance of normal bone health.

Contraindication
Sanostol®Sanobone must not be used by persons with known hypersensitivity to one of the active ingredients or any of the other constituents.

Warnings and Precautions
Consult your physician or pharmacist before using this product if you are taking other medicines or supplements, particularly anticoagulants (such as warfarin), antibiotics (such as tetracyclines and fluoroquinolones), levothyroxine, bisphosphonates (such as alendronate), or iron-containing supplements.

Use during pregnancy and breastfeeding should be under medical supervision of a physician

Do not exceed the recommended dose.

Consult your physician before use if you have kidney disease, kidney stones, hypercalcemia, hyperparathyroidism, or Boeck's disease (sarcoidosis).
This product is supplement and it is not intended for diagnosis, prevention and treatment.

Interactions
Concomitant use of vitamin D supplements together with Sanostol® Sanobone Syrup may result in excessive vitamin D intake.

Direction for use
Use in children under one year of age should be under medical supervision.
Children aged 1 to 8 years: take 5 ml daily.
Children aged above 8 years and adults: take 5 ml twice daily.
(Scaled spoon included)
It is recommended to take this product after meals.
Shake well before use.

Adverse effects:
When taken as recommended, this product is generally well tolerated. However, mild gastrointestinal discomfort or, rarely, hypersensitivity reactions may occur.
If you experience any adverse effects, consult your physician or pharmacist.

Other ingredients:
Disodium Hydrogen Phosphate, Phosphoric Acid, Sucralose, Sucrose, Glycerin, Sorbitol 70%, Propylparaben, Methylparaben, Polysorbate 80, Avicel RC-591, Citric Acid Anhydrous, Malt Extract, Orange Concentrate, FD&C Yellow No. 6, Orange Flavor, Xanthan Gum, Purified Water.

Storage conditions
Store below 25°C.
Protect from light.
Keep out of the reach of children.

ROUGINE PHARMACEUTICAL

سازنده و صاحب پروانه ساخت: شرکت داروسازی روژین
منطقه ویژه اقتصادی کاوه - ایران
سامانه پیامکی جهت ثبت و اطلاع‌رسانی شکایات: ۳۰۰۰۵۳۸۱۸۰۱۰۲۳

Manufacturer and license holder: Rougine Pharmaceutical Co.
Kaveh Special Economic Zone - Iran